

**PRE-PROCEDIMIENTO DE INSTRUCCIONES**

SCCPM #7S , rev 01.25.2022

<b>Bryan X. Lee, MD</b> <b>So. Cal. Ctr for Pain Management</b> •250 W. Bonita Ave #160 Pomona, CA 91767 •13768 Roswell Ave, #215 Chino, CA 91710 <b>T (909) 593-1002</b> <b>F (888) 257-3888</b> <a href="http://www.drblee.com">www.drblee.com</a>	Nombre: _____ Proced: _____ Centro de Cirugía: ( ) Archibald Surg.Ctr. ( ) Chino Premier Surg. Ctr ( ) Concourse Diag. & Surgery Ctr ( ) Mid Valley Surg Ctr ( ) Ontario Advanced Surgery Center ( ) Pomona Valley Hosp. Outpt Pavilion ( ) _____ <b>Horas de las citas son aproximadas. El Centro de Cirugía le llamará para confirmar la hora exacta de llegada.</b> #1 Hora de la cita: _____ AM/PM Fecha: _____ #2 Hora de la cita: _____ AM/PM Fecha: _____ #3 Hora de la cita: _____ AM/PM Fecha: _____
--	---

<b>Centros de Cirugía</b>					
( ) Archibald Surg. Ctr: 9674 Archibald Ave, #125, Rancho Cucamonga, CA 91730. (909) 296-8930	( ) Chino Premier Surg. Ctr.: 5562 Philadelphia St, #111, Chino, CA 91710 (909)517-0000	( ) Concourse Diag. & Surg Center: 18575 Gale Ave, City of Industry, CA 91748 (626) 965-3880	( ) MidValley Surg. Ctr: 4682 Ontario Mills Pkwy, Ontario, CA 91764. (909) 204-3540	( ) Ontario Advanced Surgery Center: 1211 W 6th St, Ontario, CA 91762 (909)981-8755	( ) Pomona Valley Hosp. Outpatient Pavilion 1798 N Garey Ave. Pomona, CA 91767 (909) 865-9500

**\*\*\*\* Advertencia: \$150 puede ser cargado si usted no cancela su cita(s) 24 horas de antelación. \*\*\*\***

1. **NO comer ni beber nada durante 8 horas antes de su cita.** Usted puede tomar sus medicamentos con un sorbo de agua.
2. Una persona (por ejemplo, familia, amigo, transporte médicos) deben impulsar y acompañar a usted. No hay autobús.
3. Si usted trabaja, tomarse el día libre. Usted puede volver al trabajo y la actividad normal al día siguiente.
4. **Para los pacientes tomando anticoagulantes: debe ser detenido antes del procedimiento.** Pregúntele a su doctor que prescribe o cardiólogo permiso antes de detener su anticoagulante (s) en la sangre. Si usted está tomando otro diluyente de la sangre fuera de la lista, diga el Dr. Lee. Puede seguir con su más fina (s) de sangre al día siguiente del procedimiento.
  - a) Aspirina, Plavix (Clopidogrel), Brilinta (Ticagrelor), Persantine o Aggrenox (Dipyridamole), Effient (Prasugrel) y Elmiron (Pentosan): deténgase durante 7 días.
  - b) Pradaxa (dabigatrán), Bevyxxa (Betrixaban), Reopro (Abciximab), Savaysa (Edoxaban) y Coumadin (Warfarina, INR <1.3): deténgase durante 5 días. SOLO para pacientes con Coumadin (warfarina): Debe realizarse análisis de laboratorio (INR, PT, PTT) 1 día antes de su procedimiento. Lleve el nombre del laboratorio al centro de cirugía.
  - c) Xarelto (rivaroxaban), Eliquis (apixaban), Pletal (Cilostazol) y Arixtra (fondaparinux): deténgase durante 3 días.
  - d) Aggrastat (Tirofiban), Arixtra (Fondaparinux), Fragmin (Dalteparin), Integrilin (Eptifibatide) y Lovenox (LMWH): deténgase durante 1 día.
  - e) Hierbas / Vitaminas: Vitamina E, Aceite de Pescado, Ajo, Ginseng, Vitamina A, Jengibre, Kava Kava, Clavo, Corteza de Sauce Blanco o Gingko Biloba: debería parar 7 días.
  - f) NSAIDs (medicamentos antiinflamatorios no esteroides) deben suspenderse durante 7 días: Motrin, Ibuprofen, Advil, Aleve, Naproxen, Excedrin, Celebrex, Voltaren, Diclofenac, Lodine, Etodolac, Nabumetone, Relafen, Feldene, Piroxicam, Mobic, Meloxicam , Indometacina, indocina, sulindac, trilisato, trisalicilato de colina magesio y keteoprofeno, etc.
  - g) \*\*\* Nota: Puede continuar tomando Tylenol / Acetaminophen. (no un anticoagulante) \*\*\*

**\*\*\* NOTA: Hay un mayor riesgo de complicaciones, como coágulos de sangre, derrame cerebral, parálisis, ataques al corazón, embolia pulmonar y muerte por detener su más delgada (s) en la sangre. Pero, no detenerlos antes de la inyección (s) aumentará su riesgo de complicaciones también, incluyendo hemorragia, parálisis y muerte. Discuta los riesgos con el médico que prescribe. \*\*\***

5. Si usted tiene diabetes, no tome sus medicamentos para la diabetes por la mañana antes del procedimiento. Es posible que haya pan tostado / galletas y jugo claro (jugo de manzana por ejemplo) 6 horas antes del procedimiento. Usted puede comer y reanudar sus medicamentos para la diabetes después del procedimiento.

6. Si usted está enfermo (por ejemplo, fiebre), llame a la oficina lo más pronto posible para saber si usted necesita cancelar su cita.

**Al firmar, el paciente reconozca comprender y está de acuerdo con lo anterior. El paciente ha recibido una copia de este formulario.**

x	_____	_____	_____
Firma del paciente	Nombre del paciente	Fecha	Witness Signature/Testigo